

## 【0102】sLV5FU2(FL)療法

## 【投与スケジュール】1 コース=14 日(2 週)

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W
レボホリナートカルシウム	レボホリナート	I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	↓ Day1	

## 【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
<b>Day1</b>			
①	生食注シリンジ 10mL	1 本	フラッシュ
②	グラニセロンバッグ(3mg/100mL)	1V	30 分
	デカドロン(3.3mg/1mL)	2A	
③	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2 時間
	生理食塩液 250mL	1 本	
④	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	全開で
	生理食塩液 50mL	1 本	
⑤	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	46 時間
	生理食塩液 500mL	1 本(※)	
⑥	生食注シリンジ 10mL	1 本	フラッシュ

(※)インヒューザーポンプ使用時は、生食の液量を調整

催吐性	中等度リスク
組織傷害性	フルオロウラシル:炎症性
代表的副作用	>10%・・・食欲不振、下痢、口内炎、骨髄抑制 頻度不明・・・心筋虚血、白質脳症